

Liste cumulative des mots-clefs

Cumulative Index of Key-Words

Kumulatives Stichwortverzeichnis

Abréviations/ Abbreviations/ Abkürzungen :

fr : français, French, französisch - La : latin, Latin, lateinisch
En : anglais, English, englisch - De : allemand, German, deutsch

00-Sorte, f (De) : 73-76

A

abeille (fr) : 30
Abkommen GATT (De) : 73-76, 120, 223
Absatz, m (De) : 49-50
Abschluss von Terminkontrakten (De) : 137-141
acide linoléique (fr) : 53-55
acide linolénique (fr) : 27-29
acide oléique (fr) : 27-29, 53-55
acide palmitique (fr) : 53-55
acide érucique (fr) : 38-41, 44-46
additif (fr) : 85-90
Additiv, n (De) : 85-90
adventice (fr) : 66-70
Aggressivität, f (De) : 85-90, 91-100
Agrarwissenschaft, f (De) : 44-76
agronomie (fr) : 44-76
agronomy (En) : 44-46
Alternaria (La) : 101-104
amidon (fr) : 16-18
Analysen, f (De) : 106-132
analyses (En, fr) : 106-132
Anmeldung, f (De) : 27-29
année record (fr) : 51-52
antinutritional effect (En) : 120-127
Arabidopsis thaliana (La) : 18, 19, 22
Ausgleichsbetrag, m (De) : 134-136
auto-incompatibilité (fr) : 32

B

baris (fr) : 80-84
Baris coerulescens (La) : 80-84
bee (En) : 30
bertha armyworm (En) : 51-52
Bestäuber, m (De) : 27-29, 30-31, 32-37
Bestäubung, f (De) : 30-31
Bestimmung, f (De) : 114-119

bidirectional gene (En) : 19
Biene, f (De) : 30
bile salt (En) : 114-119
biodiesel (En, fr) : 49-50, 73-76, 142-145
Biodiesel, m (De) : 49-50, 73-76, 142-145
biotechnologie (fr) : 27-29
Biotechnologie, f (De) : 27-29
biotechnology (En) : 27-29
blackleg (En) : 78-79
blackleg resistance (En) : 44-46, 47-48, 51-52,
Blair House negotiations (En) : 142-145
Börsenposition, f (De) : 137-141
Brassica campestris (La) : 51-52, 73-76, 142-145
Brassica napus (La) : 16-18, 19, 20, 24-25, 30, 44-46,
51-52, 73-76, 106-113, 142-145
Brassica nigra (La) : 21
Brassica oleracea (La) : 21
Brassica rapa (La) : 21, 44-46, 106-113
Brassica species (En) : 21, 22, 78-79
Brassicaceae (La) : 21, 22, 78-79
breeding (En) : 16-41, 53-55
breeding program (En) : 44-46
broiler (En) : 120-127

C

canola : 44-46, 47-48, 51-52, 78-79
carence en soufre (fr) : 71-72
Ceuthorrhynchus assimilis (La) : 80-84
Ceuthorrhynchus napi (La) : 80-84
Ceuthorrhynchus picitarsis (La) : 80-84
champignon (fr) : 91-100
charançon de la tige (fr) : 73-76, 80-84
charançon des siliques (fr) : 80-84
charançon du bourgeon terminal (fr) : 80-84
CHL (fr) : 32-37
chlorophyll (En) : 44-46, 47-48
Chlorophyll, n (De) : 44-46, 47-48
chlorophylle (fr) : 44-46, 47-48
chromatographie (fr) : 106-113

chromatographie

liquide haute performance (fr) : 106-113

chromosome (fr) : 21, 22-23

climat (fr) : 62-64, 80-84

climate (En) : 62-64, 80-84

colza d'hiver (fr) : 27-29, 32-37, 38-41, 56-60, 62-64, 71-72, 82-84, 94-100, 101-104, 134-136

colza de printemps (fr) : 27-29, 30-31, 71-72, 85-90, 134-136

composite hybride lignée (fr) : 32-37

conidie (fr) : 85-90, 91-100

consensus (fr) : 131-132

contract (En) : 137-141

contrat (fr) : 137-141

cotation (fr) : 137-141

crusher (En) : 47-48

crushing plant (En) : 47-48, 51-52

cryogenic storage (En) : 85-90

cultivar (En, fr) : 38-41, 44-46, 106-113

cybride (fr) : 32-37

Cylindrosporiose, f (De) : 91-100

Cylindrosporium concentricum (La) : 91-100

cécidomyie (fr) : 80-84

D

dark leaf and pod spot (En) : 101-104

dehulled seed (En) : 120-127

dehulling (En) : 51-52

Delia brassicae (La) : 80-84

determination (En) : 114-119

diester (En, fr) : 142-145

dietary fibre (En) : 120-127

digestibility (En) : 120-127

digestibilité (fr) : 120-127

disease (En) : 27-29, 66-70, 78-104

disease control (En) : 56-60, 101-104

diversification (En, fr) : 56-60

dosage (fr) : 131-132

drought (En) : 44-46, 47-48, 56-60

Dünger, m (De) : 56-60, 62

débouché (fr) : 49-50

E

échantillonnage (fr) : 131-132

écheance (fr) : 137-141

economic loss (En) : 101-104

economics (En) : 62-64, 134-141

économie (fr) : 62-64, 134-141

elution (En) : 106-113

embryo (En) : 16-18

embryon (fr) : 16-18

energy (En) : 120-127

engrais (fr) : 56-60, 62

Enthüllung, f (De) : 51-52, 120-127

environnement (fr) : 49-50

enzyme (En, fr) : 16-18, 120-127

Ertrag, m (De) : 53-55, 56-60, 62-64, 73-76

erucic acid (En) : 38-41, 44-46

Erukasäure, f (De) : 38-41, 44-46

Esterifizierung, f (De) : 49-50

estérification (fr) : 49-50

EU-12 (En) : 142-145

EU-15 (En) : 142-145

Europe à 12 (fr) : 142-145

Europe à 15 (fr) : 142-145

European norms (En) : 131-132

expression (En, fr) : 24-25

F

Fälligkeitdatum, n (De) : 137-141

falscher Mehltau, m (De) : 85-90

fat industry (En) : 73-76

fatty acid (En) : 16-18

fertilizer (En) : 56-60, 62

Fettindustrie, f (De) : 73-76

Fettsäure, f (fr) : 16-18

fiabilité (fr) : 47-48, 131-132

Flächenstilllegung, f (De) : 49-50, 61, 65, 71-72, 134-136, 142-145

flax (En) : 142-145

fongicide (fr) : 91-100

food uses (En) : 53-55, 65, 71-72, 134-136

food-Verwendung, f (De) : 53-55, 65, 71-72, 134-136

formation de conidies (fr) : 91-100

forte teneur en acide érucique (fr) : 27-29

fungicide (En) : 91-100

Fungizid, n (De) : 91-100

fungus (En) : 91-100

futures market (En) : 137-141

G

gain de productivité (fr) : 32-37

garantie (fr) : 137-141

gauze (En) : 30-31

gaze (fr) : 30-31

Gaze, f (De) : 30-31

gefleckter Kohltriebrüssler, m (De) : 73-76, 80-84

gelber Senf, m (De) : 73-76

gene (En) : 19, 20

gene mapping (En) : 21

genetic engineering (En) : 27-29

genetic map (En) : 22

genetically modified crop (En) : 24-25

genome (En) : 19, 20, 22-23

glucosinolate (En, fr) : 18, 38-41, 44-46, 51-52, 53-55, 120-127, 131-132,

Glukosinolate (De) : 18, 38-41, 44-46, 51-52, 53-55, 120-127, 131-132,

GMO (En) : 27-29

graine dépelliculée (fr) : 120-127

graine entière (fr) : 120-127

graines oléagineuses (fr) : 131-132

grosser Rapsstengelrüssler, m (De) : 73-76

H

hersage (fr) : 66-70
herse-étrille (fr) : 66-70
high erucic acid content (En) : 27-29
hirudin (En) : 51-52
HPCE-method (En) : 114-119
HPLC (En) : 106-113
huile (fr) : 73-76, 106-113
hull (En) : 120-127
hybrid (En) : 27-29, 30-31, 32-37, 44-46, 65, 73-76
hybride (fr) : 27-29, 30-31, 32-37, 44-46, 65, 73-76
hybride restauré (fr) : 32-37
hybridité (En) : 30-31
Hybridsorte,f (De) : 27-29, 30-31, 32-37, 65, 73-76

I

identification (En, fr) : 21, 106-113
IJsselmeerpolders (NL) : 61
Import,m (De) : 62-64
importations (fr) : 62-64
imports (En) : 62-64
industrial set-aside (En) : 80-84
industrie des corps gras (fr) : 73-76
industry (En) : 51-52
inheritance (En) : 24-25
inscription (fr) : 27-29
Isolat, (De) : 91-100

J

jachère (fr) : 49-50, 61, 65, 71-72, 134-136, 142-145
jachère industrielle (fr) : 80-84
jäten (De) : 66-70

K

karyotype (En) : 21
Keimfähigkeit,f (De) : 91-100
Keimrate,f (De) : 85-90
Klima,n (De) : 62-64, 80-84
Konidie,f (De) : 85-90, 91-100
Konidienbildung,f (De) : 91-100
Konidien suspension,f (De) : 85-90
Krankheit,f (De) : 27-29, 66-70, 78-104
Krankheitsresistenz, f (De) : 85-90
kryoprotektiver Effekt, m (De) : 85-90

L

Lagern, n (De) : 27-29, 56-60
Lagerung,f (De) : 85-90
leaning (En) : 56-60
lecithin (En) : 114-119
Lein,m (De) : 142-145

Leptosphaeria maculans(La) : 78-79, 101-104
libéralisation du marché (fr) : 73-76
light leaf spot (En) : 56-60, 91, 101-104
lignée mixte (fr) : 32-37
lignée pollinisatrice (fr) : 32-37
lin (fr) : 142-145
linoleic acid (En) : 53-55
linolenic acid (En) : 27-29
Linolensäure,f (De) : 27-29
Linolsäure,f (De) : 53-55
linseed (En) : 142-145
Linum usitatissimum (La) : 142-145
lipid (En) : 16-18
lodging (En) : 27-29, 56-60
lodging resistance (En) : 27-29, 56-60
lubrifiant (fr) : 73-76
Lyophilisation,f (De) : 85-90

M

maladie (fr) : 27-29, 66-70, 78-104
Mamestra configurata (La) : 51-52
marché mondial (fr) : 137-141
marché à terme (fr) : 137-141
marker (En) : 20
Marktf liberalisierung,f (De) : 73-76
marqueur (fr) : 20
maximum guaranteed area (En) : 142-145
Meligethes aeneus (La) : 80-84
micellar electrokinetic chromatography (En) : 114-119
microspore (En, fr) : 51-52
minimale Bodenbearbeitung,f (D) : 73-76
minimum soil tillage (En) : 73-76
mink (En) : 120-127
Mink,m (De) : 120-127
Mischung,f (De) : 56-60, 85-90
mix (En) : 56-60, 85-90
mixture (En) : 56-60
montant compensatoire (fr) : 134-136
Moricandia arvensis (La) : 26
mouche du chou (fr) : 80-84
Mycelwachstum,n (De) : 91-100
mélange (fr) : 56-60, 85-90

N

navette (fr) : 73-76
non-food purpose (En) : 49-50, 65, 71-72, 114-119, 134-136, 142-145
non-food Verwendung,f (De) : 49-50, 65, 71-72, 114-119, 134-136, 142-145
normalisation (fr) : 131-132
Normalisierung,f (De) : 131-132
normes européennes (fr) : 131-132
nuisibilité (fr) : 80-84

O

OGM (fr) : 27-29
oil (En) : 73-76, 106-113
oil content (En) : 27-29, 38-41, 137-141
oil industry (En) : 62-64
Oilseeds Agreement (En) : 142-145
Ols (De) : 73-76, 106-113
oleic acid (En) : 27-29, 53-55
oleosin (En) : 19
Olsaaten-Garantiefäche,f (De) : 134-136
Olsäure,f (De) : 27-29, 53-55
Oomyceten, f (De) : 85-90
Optimierung,f (De) : 106-113
optimisation (En, fr) : 106-113
organisme génétiquement modifié (fr) : 27-29
outlet (En) : 49-50
overwintering (En) : 38-41

P

PAC : 80-84
palmitic acid (En) : 53-55
Palmitinsäure,f (De) : 53-55
pathogenic variability (En) : 78-79
pellicule (fr) : 120-127
Peronospora parasitica (La) : 85-90
perte de rendement (fr) : 101-104
pest (En) : 80-84
phoma (fr) : 80-84, 101-104
Phoma lingam (La) : 80-84, 101-104
phospholipid (En) : 114-119
photorespiration (En, fr) : 26
phytopathologie (fr) : 78-104
Phytopathologie,f (De) : 78-104
phytopathology (En) : 78-104
pig (En) : 120-127
Pilz,m (De) : 91-100
plante pollinisatrice (fr) : 27-29, 30-31, 32
pod-fill (En) : 56-60
pollen beetle (En) : 80-84
pollination (En) : 30-31
pollinator (En) : 27-29, 30-31, 32-37
pollinisateur (fr) : 27-29,30-31,32-37
pollinisation (fr) : 30-31
porc (fr) : 120-127
post-emergence : 66-70
post-levée (fr) : 66-70
poulet de chair (fr) : 120-127
pouvoir de germination (fr) : 91-100
pre-emergence (En) : 66-70
Preisnotierung,f (De) : 73-76, 137-141
Preissicherung,f (De) : 137-141
prix (fr) : 73-76, 137-141
processing (En) : 120-127
procédé chimique (fr) : 66-70
procédé mécanique (fr) : 66-70
production (En, fr) : 44-46, 47-48, 53-55, 65, 71-72, 142-145

production du colza (fr) : 62-64
profitability (En) : 62-64
programme de sélection (fr) : 44-46
protein (En) : 106-113
protein rich meal (En) : 120-127
Protein,n (De) : 106-113
protéine (fr) : 106-113
pré-levée (fr) : 66-70
Pyrenopeziza brassicae (La) : 56-60, 91, 101-104

Q

QTL (En) : 20
Qualität,f (De) : 38-41, 44-46, 53-55, 73-76, 101-104, 106-113, 114-119
quality (En) : 38-41, 44-46, 53-55, 73-76, 101-104, 106-113, 114-119
qualité (fr) : 38-41, 44-46, 53-55, 73-76, 101-104, 106-113, 114-119
quantitative trait loci (En) : 20
quotas (En, fr) : 44-46, 65
Quotation,f (De) : 73-76, 137-141

R

Rapsanbausystem,m (De) : 73-76
Rapsglanzkäfer,m (De) : 80-84
Rapsproduktion,f (De) : 62-64, 73-76
ravageur (fr) : 80-84
record crop (En) : 51-52
registration (En) : 27-29
Rekord,m (De) : 73-76
reliability (En) : 47-48, 131-132
remplissage des siliques (fr) : 56-60
rendement (fr) : 53-55, 56-60, 62-64, 73-76
Rentabilität,f (De) : 73-76
rentabilité (fr) : 73-76
repousse (fr) : 49-50, 66-70
resistance (En, fr) : 44-46, 85-90
resistant variety (En) : 78-79
Resistenz,f (De) : 44-46, 85-90
reversed-phase high-performance liquid chromatography (En) : 106
rice (En) : 22
RP-HPLC (En) : 106-113
Rübsen,f (De) : 73-76

S

sampling (En) : 131-132
sarclage (fr) : 66-70
sarcluse (fr) : 66-70
Schädlichkeit,f (De) : 80-84
Schädling,m (De) : 80-84
Schmiermittel,n (De) : 73-76
Schrot,m (De) : 131-132
schwarzer Triebrüssler,m (De) : 80-84
Schwefelmangel, m (De) : 71-72

Schwein,m (De): 120-127
Sclerotinia sclerotiorum (La): 101-104
sécheresse (fr): 44-46, 47-48, 56-60
sensibilité variétale (fr): 85-90
Sensitivität,f (De): 91-100
set-aside (En): 49-50, 61, 65, 71-72, 142-145
sinapine (En,fr): 106-113
Sinapis alba (La): 73-76
soja (fr): 142-145
Sommerraps (De): 27-29, 30-31, 71-72, 85-90, 134-136
Sonnenblume,f (De): 134-136, 142-145
Sortenanfälligkeit,f (De): 85-90
soya bean (En): 142-145
spectrométrie (fr): 131-132
spring rape (En): 53-55, 71-72
spring turnip rape (En): 53-55
Stärke,f (De): 16-18
starch (En): 16-18
stem canker (En): 101-104
stem rot (En): 101-104
stem stiffness (En): 56-60
Stengelrüssler,m (De): 80-84
stress hydrique (fr): 65
stérilité génique (fr): 32-37
sulphur deficiency (En): 71-72
summer rape (En): 27-29, 30-31, 71-72, 85-90, 134-136
sunflower (En): 134-136, 142-145
surface maximale garantie (fr): 142-145
suspension de conidies (fr): 85-90
synteny (En): 22
sélection (fr): 16-41, 53-55

T

technology (En): 62-64
teneur en huile (fr): 137-141
tournesol (fr): 134-136, 142-145
tourteau (fr): 131-132
tourteau riche en protéines (fr): 120-127
transformation (En, fr): 26
transgene stability (En): 24-25
travail minimal du sol (fr): 73-76
Triticeae (La): 21
tritrateur (fr): 47-48
trituration (fr): 47-48, 51-52
Trockenheit,f (De): 44-46, 47-48, 56-60

U

Überwinterung,f (De): 73-76
Umwelt,f (De): 49-50
Union européenne à douze (fr): 142-145
Union européenne à quinze (fr): 142-145
utilisations alimentaires (fr): 53-55, 65, 71-72, 134-136
utilisations non alimentaires (fr): 49-50, 65, 71-72, 114-119, 134-136, 142-145

V

valorisation (fr): 49-50
Variabilität,f (De): 91-100
variété-00 (fr): 73-76
Verarbeitung,f (De): 26
verse (fr): 27-29, 56-60
vison (fr): 120-127
volunteer plant (En): 49-50, 66-70

W

Warenterminbörse,f (De): 137-141
water deficiency (En): 65
weed (En): 66-70
whole seed (En): 120-127
winter rape (En): 27-29, 32-37, 38-41, 56-60, 62-64, 71-72, 82-84, 94-100, 101-104, 134-136
winter turnip rape (En): 71-72
Winterraps (De): 27-29, 32-37, 38-41, 56-60, 62-64, 71-72, 82-84, 94-100, 101-104, 134-136
Wirtschaft,f (De): 62-64, 134-141
world market (En): 71-72

Y

yield (En): 53-55, 56-60, 62-64, 71-72, 73-76
yield loss (En): 101-104

Z

Züchtung, f (De): 16-41
Zuverlässigkeit,f (De): 47-48, 131-132